



## SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



# CONTROLE SANITÁRIO DO TIFO AVIÁRIO EM GALINHAS CAIPIRAS

APOIO:



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA AGRICULTURA  
E PECUÁRIA



TECNÔAGRO



## A DOENÇA

---

O Tifo Aviário é ocasionado pela *Salmonella Gallinarum*. É uma doença que pode estar presente na maioria das criações de galinhas caipiras. Ela se manifesta no plantel periodicamente, principalmente no período de verão e outono, ocasionando uma elevada mortalidade. Após o surto, as aves sobreviventes se tornam portadoras assintomáticas, que geralmente voltam a manifestar a doença quando baixar sua imunidade devido ao calor, falta de alimento e água. A mortalidade geralmente é de 40 a 80% do plantel, mas em alguns casos pode chegar até 100%.


## SINAIS CLÍNICOS

---

As aves apresentam crista cianótica, diarreia amarelo esverdeada, febre, prostração e morte súbita.



**Ave com crista cianótica (esquerda)  
e com crista normal (direita)**



**Diarreia amarelo-esverdeada**

## LESÕES

---

As aves apresentam fígado bronzeado, com aumento de tamanho e pontos necróticos, baço aumentado, ovipostura abdominal e ovários atrofiados com folículos avermelhados.



**Fígado bronzeado**



**Ovário atrofiado**

## TRANSMISSÃO

---


O Tifo Aviário é uma doença de fácil transmissão. Aves mortas em decomposição, falta de higiene na granja, presença de moscas e roedores são as principais formas de disseminação do agente entre as aves.



**Aves em decomposição  
(mortalidade por Tifo Aviário)**



**Vetores**



**Ave susceptível**

# PREVENÇÃO E CONTROLE

O controle do Tifo Aviário deverá ser feito vacinando as aves anualmente, mantendo a higiene nos estabelecimentos, fornecendo ração de qualidade, água limpa e, principalmente, não deixando aves mortas em decomposição no ambiente, a fim de evitar a transmissão da doença pelos vetores de uma granja para outra. Quando for observada elevada mortalidade, o produtor deve informar a Inspeção Veterinária do município e consultar um médico veterinário para medicar os animais. Embora o Tifo Aviário não seja considerado uma zoonose, não é recomendado consumir ovos e carne das aves durante o surto na propriedade, pois outras salmonelas poderão estar presente e ocasionar doenças de origem alimentar. Também, quando o plantel for medicado com antimicrobianos, aguardar o período de carência para consumir os ovos e as aves.

## PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE



### Contato:



Inspeção Veterinária de Passo Fundo: (54) 3316-5051  
Secretaria da Agricultura e Des. Rural: (54) 3311-1193